Tout pour l'Agriculture

NICOKABA 40 SC

40 g/l Nicosulfuron

''HERBICIDE DE POST-LEVEE SELECTIF DU MAÏS ''

NICOKABA 40 SC est un herbicide systémique de post-levée pour le contrôle des dicotylédones et graminées adventices en culture de maïs

Formulation : **SC, Suspension Concentrée**
Composition : **40 g/l Nicosulfuron**
N° Homologation : **10 0967 He**
Distributeur : **GAT RIMA**

Conditionnement : **Bidon de 0,5 litre, 1 litre, 4 litres et 20 litres**

MODE D'ACTION

NICOKABA 40 SC est un herbicide systémique de post-levée sélectif du maïs. Il est efficace sur les mauvaises herbes dicotylédones, graminées annuelles et graminées vivaces. Le Nicosulfuron est principalement absorbé par les feuilles des mauvaises, il est transporté parle le phloème et le xylème. Il bloque la synthèse des acides aminés essentiels à la division et à la croissance des adventices. Il induit des jaunissements ou rougissements qui se transforment en nécroses et provoque ainsi la destruction progressive des mauvaises herbes. Il est appliqué en post-levée du maïs et des adventices, et a une faible persistance d'action dans le sol.

MODE D'EMPLOI

- **Dose :** NICOKABA 40 SC est appliqué à la dose de **1 litre à l'hectare**.
- **Préparation de la bouillie :** Diluer NICOKABA 40 SC dans un pulvérisateur à moitié rempli, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une bouillie homogène et rajouter de l'eau en remuant la bouillie jusqu'à avoir le volume désiré pour le traitement. Préparer la bouillie à l'hectare selon le type d'appareil de traitement. Pour un pulvérisateur à dos préparer une bouillie de 200 litres à l'hectare.
- **Application :** Application foliaire à l'aide d'un pulvérisateur. Appliquer NICOKABA 40 SC aux stades 2 - 8 feuilles du maïs. Pour les adventices : 1 feuille au tallage des graminées, levée 30 cm des dicotylédones.
- **Fréquence de traitements :** Une seule application par cycle de culture.
- **Délai avant récolte :** 60 jours

PRECAUTIONS

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de NICOKABA 40 SC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

Classification toxicologique : **Classe III, peu dangereux**

Marcory Zone 4 Rue Pierre Marie Curie, Concession ADK - Lot 241
Tel: 21 25 47 39 - Fax: 20 22 52 05
Email : rimagat@yahoo.fr – RC : CI-ABJ-2010-B-196